




# Die Lendenwirbelsäule



Bei Subluxation eines Wirbelkörpers bestehen folgende Zusammenhänge:

**Subluxation (=Fehlstellung, Fixierung, Nervenirritation)**

**L = lumbal = Lendenwirbelsäule**

**Versorgungsbereich L1:**

Unterbauch, Leiste

**Auswirkungen:** Einige Arten von „chronische“ Blinddarmentzündung, ziehende Schmerzen in einer oder beiden Leistenregionen

**Versorgungsbereich L2:**

Appendix, Bauch, Oberschenkel

**Auswirkungen:** Chronische Blinddarmentzündung, Unterbauchkrämpfe, Krampfadern

**Versorgungsbereich L3:**

Geschlechtsorgane, Hoden, Gebärmutter, Blase, Hüftgelenk und Knie

**Auswirkungen:** „Frauenleiden“ fehlende oder schmerzhafte Perioden, Fehlgeburten, unerfüllter Kinderwunsch, Impotenz, Bettnässen, Hüft- und Kniebeschwerden

**Versorgungsbereich L4:**

Colon, Prostata, Ischias

**Auswirkungen:** Verstopfungen, Probleme beim Wasserlassen, Ischias und Hexenschuss

**Versorgungsbereich L5:**

Uterus, Prostata, Blase, Füße, Unterschenkel, Ischias, Iliosacralgelenk (ISG)

**Auswirkungen:** Siehe auch L3-L4, geschwollene Knöchel, kalte Füße, Schmerzen im Iliosacral-Bereich

**S = Sacrum = Kreuzbein**

**Versorgungsbereich S1-4:**

Hüften, Gesäß

**Auswirkungen:** Statikprobleme, Becken- und Hüftgelenkschmerzen, starker Einfluss auf das ISG

Ein Organ wird immer aus mehreren Etagen versorgt.  
Diese Angaben beziehen sich auf Erfahrungswerte !